



Информационный бюллетень о прерывании беременности

В этом информационном бюллетене описывается стандартная медицинская процедура прерывания беременности, которая может меняться незначительно в зависимости от проводящего ее поставщика или учреждения.

Тип аборта	Медикаментозный аборт	Дилатация и кюретаж	Дилатация и эвакуация	Искусственные роды
Другие названия этого типа аборта	<ul style="list-style-type: none">• Таблетки для прерывания беременности	<ul style="list-style-type: none">• Процедура аборта• Вакуум-экскохлеация• Вакуумная аспирация	<ul style="list-style-type: none">• Процедура аборта	<ul style="list-style-type: none">• Провоцирование преждевременных родов• Искусственная стимуляция родов и аборт при родах
Сроки проведения аборта	До 11 недель и 0 дней с первого дня последней менструации.	Как правило, до 14 недель с первого дня последней менструации.	Как правило, с 14 недели после первого дня последней менструации и до установленного законом срока.	Как правило, до установленного законом срока.
Подготовка к процедуре аборта	Поставщик медицинских услуг выдаст вам лекарства под названием мифепристон и мизопростол и расскажет вам, как их принимать.	Перед процедурой поставщик медицинских услуг может дать вам лекарства для раскрытия шейки матки (вход в матку).	Поставщик медицинских услуг может установить в шейку матки (вход в матку) мягкие расширители за несколько часов или дней до прерывания беременности, чтобы постепенно растянуть и раскрыть шейку матки. Вам также могут выдать препараты для раскрытия шейки матки.	Также могут назначить прием препаратов мифепристон, мизопростол и (или) питоцин для стимуляции родов.
Во время процедуры аборта	<p>Прием препаратов на дому прерывает беременность и выводит плод из матки так же, как это происходит при выкидыше.</p> <p>Вам назначат повторный прием у поставщика медицинских услуг (при личном присутствии, посредством телемедицины или в процедурной), чтобы убедиться в полном выведении плода.</p>	<p>Гладкие бужи расширителя помещаются в шейку матки до тех пор, пока она не расширится, чтобы поставщик медицинских услуг мог ввести в матку тонкую трубку через шейку матки.</p> <p>Трубка крепится к насосу, который мягко высасывает плодное яйцо. Процедура занимает всего несколько минут.</p>	<p>Гладкие бужи расширителя помещаются в шейку матки до тех пор, пока она не расширится, чтобы поставщик медицинских услуг мог ввести в матку тонкую трубку через шейку матки.</p> <p>Трубка крепится к насосу, который мягко высасывает плодное яйцо. Процедура занимает всего несколько минут.</p> <p>Для полного освобождения матки от остатков тканей могут использоваться и другие инструменты.</p>	<p>Препараты расширяют шейку матки и заставляют матку сокращаться, вследствие чего эмбрион выводится наружу.</p> <p>Препараты вводятся в виде таблеток (перорально), в вену или непосредственно во влагалище.</p>

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА МАССАЧУСЕТС – Информационный
бюллетень о прерывании беременности

Тип аборта	Медикаментозный аборт	Дилатация и кюретаж	Дилатация и эвакуация	Искусственные роды
Распространенные осложнения	<p>Сильные судороги и кровотечения возможны в течение нескольких часов.</p> <p>Лихорадка, тошнота, рвота, диарея, головные боли, чувство слабости или головокружение, обморок в течение 24 часов.</p> <p>Слабое кровотечение возможно в течение 2 недель и дольше.</p>	<p>Во время процедуры у вас будут спазмы. Обезболивающие препараты (анестезия) могут облегчить их, однако возможно повышение риска в связи с их приемом.</p> <p>После процедуры у вас могут быть судороги и кровотечение. Слабое кровотечение возможно в течение 2 недель и дольше.</p>	<p>Во время процедуры у вас будут спазмы. Обезболивающие препараты (анестезия) могут облегчить их, однако возможно повышение риска в связи с их приемом.</p> <p>После процедуры у вас могут быть судороги и кровотечение. Слабое кровотечение возможно в течение 2 недель и дольше.</p>	<p>Сильные судороги.</p> <p>Обезболивающие препараты (анестезия) могут облегчить их, однако возможно повышение риска в связи с их приемом.</p> <p>Кровотечение возможно в течение одной недели или дольше.</p>
Место проведения процедуры	Дома	В поликлинике или больнице	В поликлинике или больнице	В больнице

Альтернативы прерыванию беременности

Вы можете отказаться от прерывания беременности и оставить ребенка или организовать его усыновление.

На каком сроке можно делать аборт в штате Массачусетс

Период времени, в течение которого вы беременны, называется акушерским сроком. На различных стадиях акушерского срока возможны разные виды абортов:

- До 11 недель и 0 дней с первого дня последней менструации можно провести медикаментозный аборт.
- Пройти процедуру прерывания беременности или провоцирования преждевременных родов аборта можно до установленного законом предела с учетом заключения поставщика медицинских услуг и учреждения.
- При наличии определенных врожденных дефектов плода или угрозы жизни и здоровью матери в связи с беременностью никаких ограничений по срокам беременности для аборта нет.

Применение обезболивающих препаратов во время аборта

- Обезболивающие таблетки, такие как ибупрофен, могут помочь при спазмах.
- Местная анестезия уменьшает боль, и вы при этом остаетесь в сознании. Препараты местной анестезии вводятся в шейку матки.
- Закись азота помогает расслабиться и вводится путем вдыхания газа через маску.
- Умеренная седация уменьшает боль и вызывает сонливость. Успокоительные препараты вводятся посредством вливаний через вену на руке (капельница).
- Общий наркоз полностью снимает боль, при этом вы недолго находитесь без сознания. Общий наркоз осуществляется введением препаратов через капельницу или газа через маску.

Редкие осложнения

- Медикаментозный аборт и процедуры прерывания беременности
 - Кровопотеря, требующая переливания крови
 - Инфицирование
 - Остатки тканей плода в матке
 - Нежелательные реакции на препараты
 - Проблемы со свертываемостью крови

- Дилатация и кюретаж, дилатация и эвакуация и искусственные роды
 - Разрыв шейки матки или матки или травма других близлежащих органов таза.
 - В крайне редких случаях аборт может стать причиной обширного хирургического вмешательства, включая гистерэктомию (удаление матки) или травму кишечника. Вероятность летального исхода не превышает 1 на 100 000 аборт и в 10 раз ниже, чем уровень смертности при родах.

Обратитесь к врачу в следующих случаях

- Сильное кровотечение
- Усиливающиеся боль или дискомфорт
- Слабость, лихорадка, тошнота, рвота или диарея, продолжающиеся более 24 часов после аборта

Социальная помощь

Штат не вправе отказывать вам в социальной помощи или любых иных льготах, решите ли вы сделать аборт или сохранить беременность. Для получения информации о праве на получение помощи и льгот обращайтесь в Департамент помощи в переходный период штата Массачусетс (<https://www.mass.gov/orgs/departement-of-transitional-assistance>).

Запись на прием для прерывания беременности

- Чтобы найти поставщика услуг для безопасного аборта, ознакомьтесь с полным перечнем местных поставщиков услуг на веб-сайте <https://www.abortioncaremass.org>.
- Если вам нужна дополнительная помощь с поиском поставщика медицинских услуг или с транспортировкой на прием, вы можете позвонить Координатору услуг прерывания беременности по телефону (617) 616-1636.

Оплата абортивных услуг

- MassHealth Standard и MassHealth MCO оплачивают услуги по прерыванию беременности. Ваш поставщик медицинских услуг позвонит в программу MassHealth, чтобы запросить страховое покрытие для процедуры.
- Если вы беременны, живете в штате Массачусетс и у вас нет страховки, вы можете обратиться за помощью в получении страховки в службу Health Care for All по телефону (800) 272-4232. Обязательно сообщите, что вы беременны, чтобы ваше заявление было обработано незамедлительно. Специалисты службы могут помочь, даже если вы еще не решили, сохранить ли беременность или сделать аборт.
- Если у вас есть индивидуальная страховка, обратитесь в свой страховой план или к поставщику медицинских услуг, чтобы узнать, покрывает ли план услуги по прерыванию беременности.
- Если вам нужна помощь с оплатой услуг по прерыванию беременности, сразу же сообщите об этом своему поставщику медицинских услуг. Он может помочь вам получить финансовую помощь и связать вас с государственными и местными фондами финансовой поддержки аборт.

Несовершеннолетние лица и аборты

- Лица в возрасте 16 лет и старше вправе самостоятельно принимать решения в отношении собственного аборта и давать согласие на него. Вам не нужно согласие родителя или опекуна.
- Лица в возрасте до 16 лет, состоящие в браке, разводе или вышедшие из-под опеки, вправе самостоятельно принимать решения в отношении собственного аборта и давать согласие на него.
- Если вам не исполнилось 16 лет и вы не соответствуете вышеуказанным критериям, у вас есть два варианта:
 1. Вы можете привести одного из родителей или законного опекуна, чтобы такой человек подтвердил свое согласие с вашим решением.
 2. Судья может разрешить вам пройти процедуру прерывания беременности без уведомления родителя или опекуна. Координаторы услуг прерывания беременности могут предоставить вам контакты бесплатных адвокатов. Адвокат организует встречу с судьей и поможет вам в этом процессе. С Координаторами услуг прерывания беременности можно связаться по телефону (617) 616-1636.